

Viajero Universal

Recomendaciones por países



AMERICA

[Embajadas y consulados
Españoles en América](#)

América

<u>ANTIGUA Y BARBUDA</u>	3	<u>GUYANA FRANCESA</u>	23
<u>ARGENTINA</u>	4	<u>HONDURAS</u>	24
<u>BAHAMAS</u>	5	<u>ISLAS VIRGENES</u>	25
<u>BARBADOS</u>	6	<u>JAMAICA</u>	26
<u>BELICE</u>	7	<u>MARTINICA</u>	27
<u>BOLIVIA</u>	8	<u>MEXICO</u>	28
<u>BRASIL</u>	9	<u>NICARAGUA</u>	29
<u>CANADÁ</u>	10	<u>PANAMÁ</u>	30
<u>CHILE</u>	11	<u>PARAGUAY</u>	31
<u>COLOMBIA</u>	12	<u>PERÚ</u>	32
<u>COSTA RICA</u>	13	<u>PUERTO RICO</u>	33
<u>CUBA</u>	14	<u>REPÚBLICA DOMINICANA</u>	34
<u>DOMINICA</u>	15	<u>TRINIDAD Y TOBAGO</u>	35
<u>ECUADOR</u>	16	<u>URUGUAY</u>	36
<u>EL SALVADOR</u>	17	<u>VENEZUELA</u>	37
<u>EEUU-HAWAI</u>	18		
<u>GRANADA</u>	19		
<u>GUADALUPE</u>	20		
<u>GUATEMALA</u>	21		
<u>GUYANA</u>	22		

Antigua Barbuda

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea.	No hay riesgo de malaria	Buenas. Evitar bañarse en aguas más o menos estancadas de las zonas indicadas. No existe vacuna. Requiere tratamiento. Se deben tomar medidas de precaución frente a mosquitos.

Argentina

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea Se recomienda la vacunación de fiebre amarilla para los viajeros mayores de 9 meses que viajan a regiones forestales del norte y noreste, incluyendo las cataratas del Iguazú y en la provincial de Misiones así como las areas fronterizas con Paraguay y Brasil	Riesgo muy limitado, - exclusivamente por P. vivax - en zonas rurales fronterizas con Bolivia (provincias de Salta y Jujui) y con Paraguay (provincias de Misiones y Corrientes). No se considera de riesgo las Cataratas de Iguazú. Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II.	Buenas. En determinadas zonas del Sur no existe una atención hospitalaria con tecnología avanzada. Se recomienda contratar un seguro de viaje con buena cobertura. Se aconseja tomar medidas de precaución contra los mosquitos, sobre todo al amanecer y anochecer.

Bahamas

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea.</p>	<p>Existe riesgo en la Isla de Exuma (Great Exuma) por P. falciparum. Se han descrito casos autóctonos en Mayo 2006, Agosto 2007 y Marzo de 2008. No se ha encontrado riesgo en las otras islas de las Bahamas. Se recomienda profilaxis únicamente para viajar a la Isla Exuma además de medidas preventivas frente a mosquitos.</p>	<p>Buenas. el viajero debe protegerse contra las picaduras de los mosquitos.</p>

Barbados

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea.	No hay riesgo de malaria.	Buenas. Se ofrecen también policlínicas, que son descentralizadas, y clínicas privadas. El agua es potable, se puede beber directamente del grifo. Los viajeros deben protegerse de las picaduras de los mosquitos.

Belice

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año procedentes de zonas infectadas. España no se encuentra incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea.</p>	<p>Existe riesgo de paludismo, casi exclusivamente por P. vivax, en todos los distritos. El riesgo más alto es en la región del sur, la mayor incidencia se encuentra en los distritos de Stan Creek y Toledo. Se recomienda consultar con los centros de Medicina del Viajero y Sanidad Exterior para determinar la necesidad de profilaxis. Prevención recomendada tipo II.</p>	<p>Todos los municipios, así como los principales cayos (Cayo Caulker o San Pedro) cuentan con centros de salud básicos. Se recomienda contratar un seguro médico de cobertura internacional.</p>

Bolivia

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 1 año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Fiebre Amarilla (a los viajeros a partir de 9 meses que viajen a las siguientes zonas este de los Andes a altitud superior a los 2300m: Departamentos de Beni, Pando y y Santa Cruz, y áreas específicas de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija</p> <p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea.</p>	<p>Sí, principalmente P. vivax (94 en áreas por debajo de los 2.500 m en los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz, Tarija y en algunas provincias como, Lacareja, Rurenabaque y norte y sur de Yungas, del departamento de La Paz. Existe paludismo por P. falciparum, en Santa Cruz y en los departamentos del norte de Beni y Pando</p>	<p>Excepto en las grandes ciudades y en los hoteles de alta categoría, las condiciones sanitarias son deficientes. El riesgo de infecciones gastrointestinales a lo largo de todo el país hace recomendable tener especial cuidado con los alimentos, hielo y el agua de bebida. Evitar consumirlos crudos o conservados a temperatura ambiente, o adquirirlos en restaurantes económicos o mercados.</p>

Brasil

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Fiebre Amarilla, a los que viajen a los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal (incluida Brasilia) y Minas Gerais y a zonas específicas de los estados del noroeste y norte de Bahía, Paraná Central y Oeste, Piauí suroeste, Noroeste y oeste de Río Grande do sul, Oeste de Santa Catarina y norte y oeste de Sao Paulo. También se recomienda a los visitantes de las Cataratas de Iguazú.</p>	<p>Existe riesgo de malaria, principalmente por <i>P. vivax</i> aunque el <i>P. falciparum</i> se encuentra en un 15 Sí, por debajo de los 900m de altitud en los 9 estados de la “Amazonia Legal”: Acre, Amapá, Amazonas, oeste de Maranhão, norte de Mato Grosso, Pará (excepto la ciudad de Belem), Rondônia, Roraima y Tocantins (parte occidental)</p>	<p>El riesgo de infecciones gastrointestinales a lo largo de todo el país hace recomendable tener especial cuidado con los alimentos, el agua de bebida y hielo. Es conveniente tomar precauciones evitando el consumo de agua del grifo, así como de verduras y frutas que no hayan sido adecuadamente cocinadas o lavadas y desinfectadas. La diseminación del brote de dengue y dengue hemorrágico por los estados de Rio de Janeiro y Bahia obliga a tener presentes las precauciones para evitar picaduras de mosquitos</p>

Canadá

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ninguna.	Difteria-tétanos y hepatitis B.	No hay riesgo de malaria.	Buenas. Se recomienda disponer de un seguro sanitario ya que los gastos de hospitalización pueden ascender a 2.000 dólares canadienses/día.

Chile

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para viajeros internacionales.	Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.	No hay riesgo de malaria.	Agua corriente sin problemas de potabilidad, aunque al principio puede provocar rechazo. En el norte contiene alto nivel de arsénico, particularmente cerca de los centros de extracción de cobre. Recomendable tomar agua envasada. Asistencia sanitaria pública deficiente y privada de muy buen nivel. Se recomiendan seguros de viaje específicos.

Colombia

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Ningún requisito de vacunación para viajeros internacionales.</p>	<p>Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla, según zonas</p> <p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>El riesgo de malaria -P. falciparum (27, P. vivax (72- es alto durante todo el año en las zonas rurales o de jungla situadas por debajo de 1600 metros de altitud, El mayor riesgo corresponde a los departamentos del Amazonas, Antioquía, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Nariño y Vichada. Existe P. falciparum en Amazonia, Pacífico Urabá-Bajo y Cauca.</p> <p>Prevención recomendada : Tipo III; y Tipo IV.</p>	<p>El viajero debe tener precaución con el agua (beberla embotellada), hielo y los alimentos, sobre todo en zonas rurales. Se considera potable en Bogotá y en las principales ciudades del país. También se desaconseja tomar verduras crudas y ensaladas.</p>

Costa Rica

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>El riesgo de paludismo -casi exclusivamente por P. vivax - existe todo el año en la provincia de Limón En el año 2010 se notificaron únicamente 114 casos. Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo II.</p>	<p>El sistema de sanidad pública es de los mejores de América Latina, pero con aspectos que lo sitúan por debajo de los parámetros europeos (atención e instalaciones). La sanidad privada tiene tarifas muy elevadas por lo que se recomienda contratar algún seguro médico que cubra los gastos de hospitalización y repatriación. Se recomienda beber agua embotellada.</p>

Cuba

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para viajeros internacionales.	Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.	No hay riesgo de malaria.	No son equiparables a los estándares europeos y pueden escasear determinados medicamentos. Los turistas son atendidos en centros hospitalarios de mejores condiciones.

Dominica

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>No hay riesgo de malaria.</p>	<p>Buenas. Para evitar infecciones gastrointestinales se deberían seguir las normas generales de higiene de los alimentos y consumir agua embotellada.</p>

Ecuador

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas. Se exige que los nacionales y residentes en Ecuador dispongan del certificado de vacunación al salir hacia un área infectada. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Fiebre amarilla: cuando se viaja a las zonas amazónicas (Orellana, Morona, Napo, Pastaza, Sucumbios y Zamora) y en otras áreas orientales de los Andes.</p> <p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea, sarampión</p>	<p>Sí, principalmente <i>P. vivax</i> (87 y <i>P. falciparum</i>, en todas las áreas por debajo de 1.500 m. No hay riesgo en Guayaquil, Quito, la altiplanicie central y Galápagos. Hay un riesgo de transmisión más elevado en las provincias de la costa, en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabi, Orellana, Pichincha y Sucumbios. Se ha notificado resistencia por <i>P. falciparum</i>.</p> <p>Prevención recomendada: Tipo IV.</p>	<p>Se recomienda la contratación de un seguro médico que incluya la repatriación. En las provincias costeras han aumentado de forma alarmante los casos de dengue, malaria y leishmaniasis.</p> <p>Es necesario protegerse de las picaduras de insectos y tomar los medicamentos para prevenir la malaria. La difteria es endémica en el país. Hay casos de rabia animal por lo que se debe evitar el contacto con animales (perros y gatos) callejeros.</p>

El Salvador

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros con edad igual o superior a 1 año procedentes de zonas infectadas. España no se encuentra incluida en estas zonas. (OMS).</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Existe un riesgo muy bajo, casi exclusivamente por P. vivax, durante todo el año, sobre todo entre los meses de Mayo y Octubre, en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapan y La Unión. No hay riesgo en la ciudad de San Salvador. Se recomienda consultar con los centros de Medicina del Viajero y Sanidad Exterior para determinar la necesidad de profilaxis.</p>	<p>Se recomienda contratar un seguro de viaje que cubra estancias hospitalarias y tratamientos médicos, así como el supuesto de repatriación aérea a España en caso de enfermedad grave. Se deben extremar las precauciones en el consumo de alimentos y consumir agua embotellada. No se aconseja consumir alimentos en puestos ambulantes ni callejeros. Se aconseja el uso constante de repelentes de mosquitos.</p>

EEUU y Hawaii

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ninguna.	Difteria-tétanos, hepatitis B, hepatitis A. Fiebre tifoidea y vacuna antirrábica (en grupos de riesgo).	No hay riesgo de malaria. Se han notificado casos aislados de malaria autóctona, con 1 caso en Virginia en el año 2003, 7 casos en Palm Beach (Florida) en el año 2003 y un caso en Jacksonville (Florida) en el año 2010 como última notificación.	Excelentes, sin embargo, no son gratuitas y dado su elevado coste se recomienda disponer de la cobertura de un seguro médico lo más amplio posible.

Granada

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>No hay riesgo de malaria.</p>	<p>Satisfactorias. Los servicios médicos y hospitalarios son limitados y normalmente se requiere realizar pagos en efectivo antes de recibir atención sanitaria. El agua es potable, aunque se recomienda su consumo embotellada.</p>

Guadalupe

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>No hay riesgo de malaria.</p>	<p>Pueden ocurrir infecciones gastrointestinales transmitidas por el agua y los alimentos. Se recomienda seguir las normas y consejos relativos a la seguridad e higiene de los mismos.</p>

Guatemala

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros de edad igual o superior a un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Existe riesgo de paludismo por debajo de 1.500 m. durante todo el año, principalmente por P. vivax.</p>	<p>Las condiciones sanitarias son buenas tanto en la capital como en las zonas eminentemente turísticas. En el interior por el contrario resultan precarias, existiendo un riesgo importante de contraer infecciones, sobre todo gastrointestinales</p>

Guyana

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Fiebre Amarilla a los viajeros a partir de un año procedente de zonas infectadas</p>	<p>Fiebre Amarilla, Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Sí, durante todo el año en todo el interior del país por debajo de 900m. Principalmente por <i>P. falciparum</i> (45, <i>P. vivax</i> con infecciones mixtas hasta un 10 El riesgo es mayor en las regiones 1, 2, 4, 7, 8, 9 y 10; y muy bajo en las regiones 3, 5 y 6. Se han notificado casos esporádicos de paludismo en el cinturón costero densamente poblado. Se ha notificado <i>P. falciparum</i>. Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo IV.</p>	<p>Deficientes, especialmente en las poblaciones pequeñas, donde el agua no es potable. Las infecciones gastrointestinales transmitidas a través del agua y los alimentos suponen un riesgo para la salud. Como medida de precaución fundamental hay que utilizar los servicios de los mejores hoteles y restaurantes, beber agua mineral embotellada y evitar adquirir alimentos en las calles.</p>

Guyana Francesa

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año.</p>	<p>Fiebre Amarilla a partir de los 9 meses, Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>El riesgo de malaria, <i>P. falciparum</i> (45 y <i>P. vivax</i>, es alto durante todo el año en los territorios que bordean Brasil, (Valle del Río Oyapock) y Surinam (Valle del Río Maroni). En los otros 13 municipios el riesgo es bajo. Se ha notificado <i>P. falciparum</i> resistente a múltiples fármacos en zonas influidas por la emigración brasileña.</p>	<p>El viajero se debe proteger contra las picaduras de los mosquitos, sobre todo al amanecer y al anochecer, utilizando ropa adecuada, repelentes de insectos y mosquiteras por la noche.</p>

Honduras

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas, con la excepción de Panamá que solo es recomendada. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Existe riesgo de paludismo por debajo de los 1000m, predominantemente por P. vivax, en las regiones del este y en las islas de la Bahía (Roatán). El riesgo es alto en las provincias de Gracias a Dios. Se recomienda consultar con los centros de Medicina del Viajero y Sanidad Exterior para determinar la necesidad de profilaxis.</p>	<p>Se recomienda encarecidamente contratar en España, antes de desplazarse a Honduras, un seguro médico que cubra gastos de hospitalización y repatriación. Sólo las instalaciones de los hospitales privados cumplen unos mínimos de calidad. Se deben extremar las precauciones en el consumo de alimentos. El agua debe consumirse embotellada. Frutas y verduras perfectamente lavadas. No es recomendable consumir alimentos en puestos callejeros.</p>

Islas Vírgenes

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
NO SE PRECISAN	Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.	No existe riesgo de malaria.	Se recomienda evitar el contacto con aguas de ríos, lagos, estanques y arroyos. La presencia de dengue hace recomendable seguir las normas y consejos para evitar las picaduras de mosquitos.

Jamaica

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Se aconseja a los viajeros tomar precaución frente a las picaduras de los mosquitos sobre todo al amanecer y al anochecer, utilizando ropa adecuada, repelente de insectos y uso de mosquitera por la noche sobre todo en la época húmeda de lluvias (agosto a octubre).</p>	<p>Buenas.</p>

Martinica

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
NO SE PRECISAN	Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.	No existe riesgo de malaria.	Buenas. Se recomienda evitar el contacto con aguas de ríos, lagos, estanques y arroyos.

México

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.	Existe riesgo de paludismo -casi exclusivamente por P. vivax, todo el año en algunas zonas rurales muy poco visitadas por los turistas. Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II, aunque la quimioprofilaxis solo se recomienda para turistas que visitan zonas de riesgo.	Las condiciones sanitarias en general son buenas, si bien es necesario tener cuidado con el agua, que debe ser siempre embotellada, evitar el hielo, tomar alimentos cocinados y conservados de forma adecuada, no tomar preparados de puestos ambulantes. Puede haber elevados índices de contaminación atmosférica principalmente en el D.F. La Ciudad de México se encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo que puede afectar a personas que sufren cardiopatías.

Nicaragua

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Sarampión, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II. Se recomienda a los viajeros tomar medidas de protección contra la picadura de los mosquitos, y consultar con los centros de Medicina del viajero y Sanidad Exterior para determinar la necesidad de profilaxis.</p>	<p>Se recomienda contratar un seguro médico privado que cubra los gastos de intervención médica y hospitalización en los hospitales privados que ofrecen atención médica adecuada.</p>

Panamá

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a todos los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.</p>	<p>Fiebre amarilla según zonas</p> <p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea</p>	<p>Existe riesgo de malaria principalmente por P. vivax todo el año en las provincias situadas a lo largo de la costa del Atlántico y la frontera con costa Rica y Colombia</p> <p>Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo II; en zonas endémicas del este: Tipo IV.</p>	<p>Las condiciones sanitarias son satisfactorias en la ciudad de Panamá y centros turísticos. También hay algunas clínicas públicas. El agua es potable en la ciudad de Panamá y en todas las capitales de provincia.</p>

Paraguay

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas endémicas a partir de 1 año de edad. España no es un país endémico.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea. Poliomieltis, Fiebre amarilla</p>	<p>Principalmente por P. vivax. Riesgo moderado en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazu y Caazapa. En el resto del país el riesgo es nulo o insignificante.</p>	<p>En los últimos años son frecuentes los brotes de dengue. Se han dado casos de Dengue Hemorrágico. Es necesario evitar picaduras de mosquitos.</p> <p>En el Departamento de Alto Paraná se han registrado casos de fiebre tifoidea. Deben tomarse precauciones especiales a la hora del consumo de alimentos y agua. Se recomienda el consumo de agua mineral, a causa del alto contenido en cloro del agua del grifo.</p>

Perú

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Ningún requisito de vacunación para viajeros internacionales.</p>	<p>Fiebre amarilla según zonas</p> <p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea y poliomielitis.</p>	<p>Sí, principalmente por P. vivax (89 y P. falciparum, en todas las áreas por debajo de los 2000m en áreas rurales, excepto en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.</p> <p>Prevención recomendada en zonas de riesgo de P. vivax: Tipo II; en el departamento de Loreto: Tipo IV.</p>	<p>En general son buenas. En todo el país, y principalmente en el norte y en la selva, se deben extremar las medidas de protección frente a las picaduras de mosquitos para evitar, entre otras enfermedades fiebre amarilla, dengue y malaria.</p>

Puerto Rico

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria, Hepatitis A.	No existe riesgo de malaria.	Buenas. El riesgo de infecciones gastrointestinales a lo largo de todo el país hace recomendable tener especial cuidado con los alimentos y el agua de bebida. Evitar consumirlos o adquirirlos en restaurantes económicos o mercados.

Rep. Dominicana

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.	Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.	Existe bajo riesgo de paludismo, exclusivamente por <i>P. falciparum</i> , durante todo el año especialmente en las zonas rurales de las provincias del oeste próximas a la frontera con Haití, de Azua, Bahoruco, Dajabón y y en la provincia de AltaGracia. En otras áreas el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. No hay datos de resistencia de <i>P. falciparum</i> a ningún antipalúdico.	El agua no es potable. Se aconseja consumir agua mineral embotellada, evitar el hielo y tomar alimentos cocinados y conservados en condiciones adecuadas, no ingerir alimentos de puestos ambulantes. No existe convenio con la Seguridad Social. Es aconsejable obtener un seguro médico válido en el extranjero que cubra la estancia en la República Dominicana.

Trinidad Tobago

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Fiebre amarilla a mayores de 9 meses, Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>No existe riesgo de malaria.</p>	<p>En general son adecuadas. El nivel de higiene y limpieza en las poblaciones es correcto y el agua es potable, aunque es recomendable la utilización de agua mineral embotellada para mayor tranquilidad. No se recomienda adquirir alimentos en las calles.</p>

Uruguay

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas y de países infectados de acuerdo con la situación epidemiológica y la evaluación del riesgo. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>No hay riesgo de malaria.</p>	<p>Se dispone de buenas prestaciones sanitarias en general en las caras clínicas privadas. Se advierte que al entrar en una clínica u hospital es necesario pagar el ingreso por adelantado en efectivo o con tarjeta de crédito Es necesario tomar precauciones con los alimentos y beber agua mineral embotellada. Se debe evitar el consumo de mariscos, “ceviche” y de los alimentos que se venden en puestos callejeros.</p>

Venezuela

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Ningún requisito de vacunación para viajeros internacionales.</p>	<p>Fiebre Amarilla: a todos los viajeros mayores de 9 meses que viajen a Venezuela excepto a la zona costera del norte.</p> <p>Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.</p>	<p>Existe riesgo de paludismo por <i>P. vivax</i> (75 y <i>P. falciparum</i> (25 , a lo largo de todo el año en algunas zonas rurales de los estados de Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Delta del Amacuro. Existe riesgo bajo en los estados de Apure, Monagas, Sucre y Zulia. El riesgo de paludismo por <i>P. falciparum</i> está principalmente restringido a municipios de zonas de la jungla del Amazonas</p> <p>Prevención recomendada Tipo II. Tipo IV</p>	<p>Respecto a la alimentación, excepto en zonas rurales, se puede confiar en la higiene de los productos, aunque es cada vez menor, siempre que se adquieran en establecimientos apropiados.</p> <p>Es necesaria una correcta protección contra la picadura de mosquitos, sobre todo al amanecer y al anochecer, utilizando repelentes de insectos, y el uso de mosquiteras para la noche.</p>